

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Menthosept

1,5 mg, tabletki do ssania
(Cetylpyridinii chloridum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Menthosept ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po trzech dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Menthosept i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Menthosept
3. Jak stosować Menthosept
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Menthosept
6. Inne informacje

1. CO TO JEST MENTHOSEPT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Menthosept jest lekiem w postaci tabletek do ssania. Zawiera chlorek cetylopirydyniowy, czwartorzędowy związek amoniowy o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym na drobnoustroje wywołujące zapalenia jamy ustnej i gardła.

Lek stosuje się do odkażania jamy ustnej, dziąseł i gardła w przebiegu zapalenia bakteryjnego i grzybiczego. Stosuje się także w stomatologii do odkażania jamy ustnej, jeśli możliwość pielęgnacji jamy ustnej jest ograniczona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MENTHOSEPT

Kiedy nie stosować leku Menthosept :

- u dzieci do 6. roku życia.
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na substancję czynną - chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Menthosept (wymienionych w punkcie 6, „Co zawiera Menthosept”).

W przypadku podejrzenia uczulenia należy poradzić się lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Menthosept

W przypadku zapaleń gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami lub wymiotami, niezależnie od stosowania leku Menthosept niezbędne jest zasięgnięcie porady lekarskiej.

Stosowanie leku Menthosept z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy unikać stosowania leku Menthosept bezpośrednio przed lub po stosowaniu leków w postaci roztworów zawierających kwas acetylosalicylowy (lek przeciwbólowy).

i przeciwzapalny, często stosowany na przeziębienie), ponieważ działanie może ulec osłabieniu.

Stosowanie leku Menthosept z jedzeniem i pićm

Ze względu na działanie miejscowe na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, lek należy stosować po posiłku lub co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Menthosept, ze względu na ogólnie przyjętą zasadę unikania przyjmowania leków podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie obserwowano niekorzystnego wpływu leku Menthosept na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Menthosept

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. fruktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ MENTHOSEPT

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

lecniczo: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (nie więcej niż 8 tabletek na dobę);

profilaktycznie: 2-3 tabletki na dobę.

Dzieci powyżej 6 lat:

lecniczo: ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (nie więcej niż 6 tabletek na dobę);

profilaktycznie: 1-2 tabletki na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Menthosept

Stosowanie większej liczby tabletek niż zalecana nie zwiększa skuteczności działania, a może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub biegunkę.

Pominięcie zastosowania leku Menthosept

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Menthosept

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Methosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób nadwrażliwych (uczulonych) na składniki leku mogą wystąpić reakcje alergiczne (uczuleniowe) i przemijające zaburzenia smaku.

Stosowanie dużej liczby tabletek może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i żołądka, nudności, wymioty.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ MENTHOSEPT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od wilgoci i światła.

Nie stosować leku Menthosept po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku Menthosept jeśli widoczna jest zmiana barwy tabletek z białej na żółtą.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Menthosept

Substancją czynną leku jest chlorek cetylopirydyniowy.

Inne składniki leku to: sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, guma guar, powidon K 90, powidon K 30, magnezu stearynian, aromat eukaliptusowo-mentolowy.

Jak wygląda Menthosept i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Menthosept są białe i okrągłe.

Pudełko zawiera 20 lub 40 tabletek w blistrach oraz ulotkę dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA

ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź

(logo)

tel.: (042) 654 00 70

faks: (042) 654 02 91

e-mail: sekretariat@polfalodz.com.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 2008.06.13

2008-06-13

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-052 Warszawa
ul. Miłkowska 15